

การเปรียบเทียบอาการไม่พึงประสงค์ของยา tafluprost และ latanoprost^[2,3]

ยา	Tafluprost	Latanoprost
อาการไม่พึงประสงค์	<ul style="list-style-type: none"> - ตาแดง - ระคายเคืองตา - แสบตา - เยื่อぶตาอักเสบ - ต้อกระจก - ตาแห้ง - ตาพร่ามัว - ขนตาสีเข้มขึ้น - ขนตาวาวขึ้น เป็นต้น	<ul style="list-style-type: none"> - ปวดตา - แสบตา - ตาแดง - รู้สึกเหมือนมีอะไรเข้าตา - ขนตาวาวขึ้น - ตาพร่ามัว - ขนตาหนาขึ้น - คันตา - ตาดำสีเข้มขึ้น เป็นต้น
การใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์	ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยา tafluprost และ latanoprost ในระหว่างที่ตั้งครรภ์	
การใช้ยาในหญิงให้นมบุตร	ควรใช้อย่างระมัดระวังในหญิงที่กำลังให้นมบุตร	
ข้อห้ามใช้	-	ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยา latanoprost, benzalkonium chloride, หรือส่วนประกอบอื่นๆในตำรับ
ข้อควรระวัง	<ul style="list-style-type: none"> - ใช้อย่างระมัดระวังในผู้ป่วยที่มีการอักเสบภายในลูกตา ผู้ป่วยที่ผ่าตัดเอาเลนส์ตาออก และผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อจอประสาทตาบวม - ไม่แนะนำให้ใช้ในผู้ป่วยเด็ก เนื่องจากอาจทำให้สีม่านตาเข้มขึ้นถาวรหลังจากใช้ในระยะเวลา 	<ul style="list-style-type: none"> - ใช้อย่างระมัดระวังในผู้ป่วยที่เคยมีประวัติการอักเสบภายในลูกตา เช่น ม่านตาอักเสบ - ใช้อย่างระมัดระวังในผู้ป่วยที่เคยมีประวัติกระจกตาอักเสบจากเชื้อไวรัสเริม