

ยาระบายที่แนะนำสำหรับเด็ก 1 ขวบ^[1-6]

ยา	ขนาดยา	ผลข้างเคียง
<p>1.Glycerin suppositories (รูปแบบยาเหน็บทวาร) ระยะเวลาเริ่มออกฤทธิ์ 15-30 นาที.</p>	<p><u>ระยะสั้น</u> ทารกและเด็กอายุน้อยกว่า 2 ปี ยาเหน็บสำหรับเด็ก: 1 แท่งครั้งเดียว อาจให้ซ้ำสูงสุด 3 วัน (ถ้าจำเป็น) *ไม่ควรใช้บ่อยเนื่องจากจะเกิดการทนต่อยา และอาจทำให้เกิดการระคายเคืองทวารหนักและเยื่อรอบทวารหนัก</p>	<p>ระคายเคืองทวารหนัก ท้องอืด ปวดท้อง ท้องเสีย</p>
<p>2.Saline enema (รูปแบบสวนทวาร) ระยะเวลาเริ่มออกฤทธิ์ 1-15 นาที.</p>	<p><u>ระยะสั้น</u> ทารก(1เดือน-1ปี) น้ำหนักน้อยกว่า 1 กก. 5 มล. น้ำหนักมากกว่า 1 กก. 10 มล. วันละ 1 -2 ครั้ง *หลีกเลี่ยงการสวนทวารโดยไม่จำเป็นในเด็กเล็กเพราะจะยิ่งเพิ่มความกลัวถ่ายอุจจาระและทำให้พฤติกรรมกลั่นอุจจาระรุนแรงขึ้น</p> <p><u>ระยะยาว</u> -</p>	<p>ปวดหรือไม่สบายบริเวณทวารหนัก ท้องอืด</p>
<p>3.Lactulose (รูปแบบ 70% solution) ระยะเวลาเริ่มออกฤทธิ์ 24-48 ชั่วโมง</p>	<p><u>ระยะสั้น</u> ทุกช่วงอายุ 4-6 มล./กก./วัน ขนาดสูงสุดไม่เกิน 120 มล.ต่อวัน เป็นเวลา 6 วัน</p> <p><u>ระยะยาว</u> ทุกช่วงอายุ 1-3มล./กก./วัน (1-2 กรัม/กก./วัน) วันละครั้งหรือแบ่งสองครั้งต่อวัน</p>	<p>ท้องอืด ท้องเฟ้อ ปวดท้อง อุจจาระเล็ด</p>
<p>4.Polyethylene glycol 4000 (PEG4000) (รูปแบบผง) ระยะเวลาเริ่มออกฤทธิ์ 24-96 ชั่วโมง</p>	<p><u>ระยะสั้น</u> ทุกช่วงอายุ 1-2 กรัม/กก แบ่งวันละ 1-2 ครั้ง 3-7 วัน (ขนาดสูงสุดไม่เกิน 100กรัม/วัน) *ควรผสมหรือกินน้ำตามหลังกินยาในปริมาณอย่างน้อย 250-500 มล.</p> <p><u>ระยะยาว</u> ใช้ในเด็กอายุมากกว่า 1 ปี เนื่องจากมีข้อมูลในเด็กทารกค่อนข้างจำกัดและพบรายงานผลข้างเคียงในเด็กทารกได้บ่อยกว่าเด็กโต</p>	<p>ท้องเสีย ท้องอืด ท้องเฟ้อ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง</p>